



# LA SANTE AU COURS DE LA GROSSESSE

## Etude Grossesse et Alcool 2017

EPP réalisée par  
Dr Véronique LANDEL, Addictologue  
Caroline GUENNI, Infirmière  
ELSA GHH (Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie)  
Et Fatima MOKHTARI Technicien qualité  
Direction qualité Gestion des Risques GHH

Soirée thématique  
Réseau Maillage et Périnatalité Eure et Seine Maritime  
21 novembre 2017

# Méthode

## EPP - Evaluation des pratiques professionnelles

- Etude menée auprès des médecins, internes, cadres sages femmes et sages femmes de la Maternité du GHH, de mai à octobre 2017
  - ↳ Enquête par auto questionnaire anonyme de 14 questions extraites de l'étude « Grossesse et alcool » menée par l'ORS en 2007



### Référentiels :

- Les conduites d'alcoolisation au cours de la grossesse - Recommandations de la SFA (Société française d'alcoologie)
- Mésusage de l'alcool, dépistage, diagnostic et traitement : cf. « femmes enceintes » - Recommandations de la SFA

# Résultats de l'étude

- 37 réponses reçues :
  - ✓ 8 Obstétriciens
  - ✓ 2 Internes
  - ✓ 27 Cadres sages femmes et sages femmes


Sur :

- 86 questionnaires transmis à :
  - ✓ 11 médecins
  - ✓ 5 internes
  - ✓ 70 cadres sages femmes et sages femmes

- *Analyse par comparaison avec les résultats de l'étude ORS 2007 sur les maternités où avaient été réalisées des actions de formation / sensibilisation*

Question 1 - Ont été interrogés par une femme enceinte ou accouchée sur les risques liés à l'alcool

Sur 37 réponses:




Comparatif résultats

	<u>2017</u>	<u>2007</u>
Oui	46%	40%
Non	54%	59%

6% de « Oui » en plus par rapport à 2007

## Q 7 - Les professionnels mettent en garde sur les effets fœtaux de l'alcool




Comparatif résultats

	<u>2017</u>	<u>2007</u>
Oui	54%	46%
Quand vous suspectez ...	43%	38%
Non	0%	11%

- Les « OUI » ont progressé par rapport à 2007,
- Cependant ce n'est pas encore systématique, en témoigne le nombre de « Quand vous suspectez un problème d'alcool... »

Q 3 - Parmi ceux ayant discuté des risques liés à l'alcool, ils pensent répondre aux attentes des femmes enceintes:

## Sur 37 réponses




## Comparatif résultats

	<u>2017</u>	<u>2007</u>
Oui	35%	33.5%
Parfois	54%	55%
Non	8%	3.5%
Non exprimés	3%	8%

Peu d'évolution...

## Q 4 -Ont été confrontés à un problème de consommation d'alcool

### Sur 37 réponses




### Comparatif résultats

	<u>2017</u>	<u>2007</u>
Oui	84%	60%
Non	16%	37%

84% de « OUI »...

Q 5 - Pour les professionnels confrontés, le dialogue a-t-il été établi avec la femme enceinte ?




## Comparatif résultats

	<u>2017</u>	<u>2007</u>
Oui	45%	27%
Parfois	55%	59%
Non	0%	13%

- Forte progression des « OUI »...
- Les 55% de parfois témoigne de la tentative d'ouvrir le dialogue
- Disparition des « Non »

## Q 6 - Quand le dialogue n'a pas systématiquement été établi, c'est en raison de :

Il était possible de cocher Plusieurs réponses :




### Comparatif résultats

	<u>2017</u>	<u>2007</u>
Déni de la femme	59%	77%
Difficulté du prof.	47%	44%

## Q 8 - Quand une femme vue en consultation présente un problème d'alcool

Sur 37 réponses



### Comparatif résultats

	<u>2017</u>	<u>2007</u>
Vs contactez des praticiens	89%	71%
Vs gérer le problème seule	3%	3%
Les 2 propositions	0%	24%

Très positif : Les partenaires sont repérés

## Q 9 - le dépistage du SAF chez les nouveaux nés devraient être systématique

Il était possible de cocher plusieurs réponses :


	Comparatif	
	2017	2007
Si la mère présente une consommation excessive régulière* d'alcool	92%	81%
Si la mère présente une consommation excessive occasionnelle** d'alcool	84%	76%
Si la mère présente une consommation modérée régulière d'alcool	92%	81%
Si le père a un problème avec l'alcool	19%	45%

\*> 2 verres par jour (verre standard)

\*\*> 5 verres en une seule occasion

- Evolution positive
- Cependant, 6 professionnels n'ont pas retenu le « consommation excessive occasionnelle d'alcool » comme risque potentiel

## Q10 - chez la femme enceinte le risque foetal existe ?



Réponse attendue : 1 VERRE / JOUR

- 36 professionnels ont répondu « A partir d'1 verre/jour »
- 1 Professionnel a répondu « A partir de 2 verres / jour »

### Comparatif résultats

	<u>2017</u>	<u>2007</u>
1 verre/J	97%	88%
2 verres/J	3%	11%
5 verres/J	0%	1.2%

La connaissance est là !


Réponses les plus citées à la question 14 sur les principaux risques encourus par le fœtus :

- Retard mental
- Déficit psychomoteur
- Dismorphies et retard de croissance

Q11- Quelles sont les boissons qui présentent un risque chez la femme enceinte parmi celles citées...

### Boissons citées

Vin - bière - Cidre - Apéritifs - Digestifs



100% des Professionnels ont donné la réponse attendue = TOUS LES ALCOOLS

### Comparatif résultats


	<u>2017</u>	<u>2007</u>
Les 5 boissons	100%	92%

La connaissance est là !  
Arrêt de la banalisation des boissons  
moins dosées en alcool pur type cidre...

## Q12 - Besoin d'information

Il était possible de cocher Plusieurs réponses :

1. Les effets sur le fœtus
2. Le dépistage de l'alcoolisation chez la femme enceinte
3. La prise en charge de la femme enceinte
4. La prise en charge de de l'enfant




Il ressort comme en 2007 un fort besoin d'information, notamment sur le dépistage chez la femme enceinte et sa prise en charge.

Attente également mais moindre sur la prise en charge de l'enfant ; sans doute minorée par l'inclusion dans l'enquête des professionnels exerçant uniquement en maternité

## Q13 - connaissances des structures d'accueil pour femmes ayant un problème avec l'alcool

36 réponses / 1 non exprimé



### Comparatif résultats

	<u>2017</u>	<u>2007</u>
Oui	35%	26%
Non	62%	71%

Progression des « Oui » par rapport à 2007....

# Conclusion :

- **Les points forts**

- ✓ Les connaissances sur les boissons alcoolisées sont présentes.
- ✓ Les connaissances sur les risques fœtaux et les structures d'accueil en addictologie ont progressé.
- ✓ Le dialogue avec la femme enceinte est plus souvent engagé.
- ✓ Les partenaires référents sont repérés et les liens avec les correspondants sont bien établis.

- **Les axes d'amélioration**

- ✓ Encourager à délivrer le message systématique de prévention auprès des femmes enceintes
- ✓ Favoriser le dépistage

# Plan d'actions :

Afin de maintenir cette dynamique d'amélioration des connaissances et des bonnes pratiques, nous envisageons la mise en place d'actions :

- Intervention auprès des professionnels dans le but de leur apporter les informations attendues :
  - ✓ Méthodes de dépistage
  - ✓ Orientation des femmes en difficulté
  - ✓ Autres information à la demande
- Elaboration d'un questionnaire, outil d'aide au dépistage des situations à risque chez la femme enceinte